

Aufklärung zur Gabe von BUSCOPAN Ampullen i.v.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Zur Verbesserung der Diagnostik ist es notwendig, Ihnen BUSCOPAN i.v. zu verabreichen.

Bitte lesen Sie diese Aufklärung genau durch und unterschreiben Sie diese.

Was müssen Sie vor dem Gebrauch beachten?

BUSCOPAN Ampullen dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Butylscopolaminiumbromid oder einen der sonstigen Bestandteile von BUSCOPAN Ampullen sind.
- bei mechanischen Verengungen (Stenosen) des Magen-Darm-Trakts
- bei krankhafter Aufweitung des Dickdarms (Megakolon)
- bei Harnverhaltung bedingt durch mechanische Stenosen der Harnwege (z. B. bei Prostataadenom)
- bei Grünem Star (Engwinkelglaukom)
- bei krankhaft beschleunigtem Herzschlag (tachykarden Herzrhythmusstörungen)
- bei einer besonderen Form krankhafter Muskelschwäche (Myasthenia gravis).

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von BUSCOPAN Ampullen ist erforderlich,

- wenn Sie anticholinerge Arzneimittel wie BUSCOPAN Ampullen anwenden; diese können den Augeninnendruck erhöhen. Wenn sich nach Injektion von BUSCOPAN Ampullen eine schmerzhafte Augenrötung mit Sehverlust entwickelt, könnte ein bisher nicht erkanntes Glaukom vorliegen. Deshalb sollte in diesem Fall umgehend ein Augenarzt aufgesucht werden.
- nach parenteraler Gabe von BUSCOPAN Ampullen sind anaphylaktische Reaktionen bis hin zum Schock aufgetreten. Wie bei allen Arzneimitteln, die solche Reaktionen hervorrufen können, sollten BUSCOPAN Ampullen-Injektionen unter entsprechender Beobachtung verabreicht werden.
- denn Patienten mit bestehenden kardialen Risiken (koronare Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen) sollten zur Durchführung endoskopischer Untersuchungen am oberen Magen-Darm-Trakt BUSCOPAN Ampullen nur mit erhöhter Vorsicht erhalten.

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass die Verwendung von BUSCOPAN die diagnostischen Möglichkeiten verbessert, aber auch zu Schwindel und durch Akkommodationstörungen (Fähigkeit des Auges in unterschiedlichen Entfernungen ein scharfes Bild zu liefern) zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Bedienbarkeit von Maschinen führen kann.

Diese Beeinträchtigungen bilden sich üblicherweise nach wenigen Stunden zurück.

Ich fühle mich ausreichend aufgeklärt und bin mit der Verabreichung von BUSCOPAN Ampullen einverstanden.

Hannover, den _____

(Unterschrift Patient)