

Aufklärung zur Gabe von Dormicum

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Damit wir bei Ihnen die notwendige Kernspintomographie durchführen können, ist zur Beruhigung die Gabe von Dormicum 7,5 mg Filmtabletten erforderlich.

Bitte lesen Sie diese Aufklärung genau durch und unterschreiben Sie sie.

Was müssen Sie vor dem Gebrauch beachten?

Dormicum 7,5 mg Filmtabletten darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Midazolam, andere Benzodiazepine oder einen der sonstigen Bestandteile von Dormicum 7,5 mg Filmtabletten sind
- wenn Sie früher einmal abhängig von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln waren
- bei akuter Vergiftung mit Alkohol, Schlaf- und Schmerzmitteln oder Arzneimitteln gegen bestimmte seelische Erkrankungen (Neuroleptika, Antidepressiva, Lithium-Präparate)
- bei schwerer, krankhafter Muskelschwäche (Myasthenia gravis)
- bei schwerer Beeinträchtigung der Atmung mit Schlafapnoe
- bei schweren Leberschäden

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dormicum 7,5 mg Filmtabletten ist erforderlich:

- bei dauerhafter Beeinträchtigung der Atmung
- bei Herzschwäche
- bei eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion
- bei hirnorganischen Veränderungen
- bei schlechtem Allgemeinzustand und/oder Übergewicht

Nebenwirkungen:

Gedächtnisstörungen

Dormicum 7,5 mg Filmtabletten kann zeitlich begrenzte Gedächtnislücken (anterograde Amnesien) verursachen. Das bedeutet, dass Sie sich z. B. an Handlungen, die Sie nach der Einnahme von Dormicum 7,5 mg Filmtabletten ausgeführt haben, später nicht mehr erinnern können d.h. Sie sind nach der Einnahme von Dormicum 7,5 mg Filmtabletten bis zum nächsten Morgen nicht geschäftsfähig. Dieses Risiko steigt mit der Höhe der Dosierung und kann durch eine ausreichend lange ununterbrochene Schlafdauer (7 - 8 Stunden) verringert werden.

Psychische und „paradoxe“ Reaktionen

Bei der Anwendung von Benzodiazepinen kann es, insbesondere bei älteren Patienten, zu Sinnestäuschungen sowie zu einer Wirkungsumkehr (sogenannten „paradoxen Reaktionen“ wie Unruhe, Reizbarkeit, aggressivem Verhalten, Alpträumen, Wahnvorstellungen, unangemessenem Verhalten und anderen Verhaltensstörungen) kommen. In solchen Fällen sollte die Behandlung mit Dormicum 7,5 mg Filmtabletten beendet werden.

Depressionen

Unter Umständen kann durch Dormicum 7,5 mg Filmtabletten das Krankheitsbild einer bereits bestehenden Depression verstärkt werden, wenn keine geeignete Behandlung dieser Erkrankung mit entsprechenden Arzneimitteln (Antidepressiva) erfolgt (Selbstmordgefahr).

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich am Untersuchungstag bis zum nächsten Morgen wegen der Einschränkung der Reaktionsfähigkeit kein Kraftfahrzeug führen, Maschinen bedienen oder andere gefährvolle Tätigkeiten ausführen darf.

Ich fühle mich ausreichend aufgeklärt und habe keine Fragen mehr.

Hannover _____

Unterschrift des Patienten _____